

中国梧桐科二新种和粗齿梭罗的补充记载

徐颂军

李秉滔

(华南师范大学 广州, 510631) (华南农业大学 广州, 510642)

Two new species and an additional description of one species of the Sterculiaceae from China

XU Song-Jun LI Bing-Tao

(South China Normal University, Guangzhou 510631) (South China Agricultural University, Guangzhou 510642)

Abstract Two species from China, *Reevesia lumlingensis* Hsue ex S. J. Xu and *Sterculia guangxiensis* S. J. Xu et P. T. Li, are described as new. An additional description of the flower of *Reevesia rotundifolia* Chun is given.

Key words Sterculiaceae; *Reevesia*; *R. lumlingensis*; *R. rotundifolia*; *Sterculia*; *S. guangxiensis*; New species; China

摘要 描述了国产梧桐科植物 2 新种, 并对梭罗属的粗齿梭罗作了花的补充描述。

关键词 梧桐科; 梭罗属; 隆林梭罗; 粗齿梭罗; 苹婆属; 桂苹婆; 新种; 中国

1 隆林梭罗 新种 图 1

Reevesia lumlingensis Hsue ex S. J. Xu, sp. nov. Fig. 1

Reevesia lumlingensis Hsue in Enum. Guangxi Pl. (广西植物名录) no. 2, 199, 1971. nom. nud.

Proxima *R. pubescenti* Mast., a qua foliis majoribus subtus secus venas sparse stellato-pilosis, nervis basilaribus 5, alis seminum e basi bilateraliter expansis et semina pro parte majore cingentibus differt.

Arbor vel frutex; rami juvenales fulvo-pubescentes. Folia alterna, tenuiter coriacea, oblongo-elliptica, 13~18 cm longa, 5~6.5 cm lata, apice obtusa vel acuta, basi obtusa vel rotundata, supra glabra, subtus secus venas sparse stellato-pilosa, nervis basilaribus 5, supra impressis subtus prominentibus; petioli 2.5~3 cm longi, fulvo-pubescentes. Capsula lignosa, ellipsoideo-obovoida, 4.5~5 cm longa, quinquangula, fulvo-stellato-pubescent, maturitate quinquevalvis; stipes fructus robustus, 3~5 cm longus; semina cum alis 3 cm longa; alae membranaceae, ovatae vel elliptico-ovatae, apice obtusae, maturitate brunneae, e basi seminum bilateraliter expansae et semina pro parte majore cingentes.

China. Guangxi (广西): Longlin (隆林), Jinzhong Mt. (金钟山), 1957-06. Y. K. Li (李荫昆) P00869 (holotype, CANT).

乔木或灌木, 小枝幼时略被淡黄褐色柔毛。叶互生, 薄革质, 长椭圆形, 长 13~18cm, 宽 5~6.5 cm, 顶端钝或急尖, 基部钝或圆弧形, 上面无毛, 下面沿叶脉被很稀疏的短星状毛, 基生脉 5 条, 叶脉在上面凹陷, 在下面凸出; 叶柄长 2.5~3 cm, 被淡黄褐色短柔毛。蒴




图1 隆林梭罗 1. 果枝; 2. 果瓣; 3. 种子; 4. 星状毛。(余汉平 绘)

Fig.1 *Reevesia lumlingensis* Hsue ex S. J. Xu 1. Fruiting branch; 2. Fruit valve; 3. Seeds; 4. Stellate hairs.

果木质, 椭圆状倒卵形, 长 4.5~5 cm, 有 5 棱, 被淡黄褐色星状短柔毛, 成熟后分裂成 5 个果瓣; 果柄粗壮, 长 3~5 cm; 种子具翅, 连翅长 3 cm, 翅膜质, 卵形或椭圆状卵形, 顶端钝,

成熟时褐色,基部向两边凸出,包围着种子大半部。

本新种与梭罗树 *R. pubescens* Mast. 较相似,但叶较大,基生脉 5 条,叶下面的毛被很稀疏,以及种子的翅在基部向两边凸出,包围着种子的大半部,可与后者相区别。

2 桂苹婆 新种 图 2

Sterculia guangxiensis S. J. Xu et P. T. Li, sp. nov. Fig. 2

Species *S. lanceolatae* Cav. affinis, sed foliis obovatis vel elliptico-obovatis, basi cuneatis differt.

Arbor 7 m alta; rami juvenales paulo pubescentes. Folia alterna, tenuiter coriacea, obovata vel elliptico-obovata, 10~18 cm longa, 4.5~6 cm lata, apice acuta vel breviter acuminata, basi cuneata, supra glabra, subtus subglabra, nervis lateralibus 9~11-jugis paulo arcuatis ad marginem obscure anastomosantibus; petioli 1~1.5 cm longi, apice inflati, leviter pubescentes. Folliculi scarlatini, quini, stellati, oblongo-elliptici, 3.5~6 cm longi, 1.5~2 cm lati, apice rostrati (rostellis fere 4 mm longis), basi obtusi, dense flavo-pubescentes et stellato-pilosi, terni semina gerentes; semina nigricantia, ellipsoidea, 10~12 mm longa, fere 8 mm diam., levia.

China. Guangxi (广西): SE Shangsi County (上思县东南部), Shiwandashan Mt. (十万大山), fairly common, in dry, rocky slit of woody thicket, 1933-06-20, W. T. Tsang (曾怀德) 22511 (holotype, IBSC).

乔木,高 7 m;小枝幼时略被毛。叶互生,薄革质,倒卵形或椭圆状倒卵形,长 10~18 cm,宽 4.5~6 cm,顶端急尖或短渐尖,基部楔形,上面无毛,下面几无毛;侧脉每边 9~11 条,稍弯拱,在近叶缘处不明显连结;叶柄长 1~1.5 cm,略被毛,叶柄在顶端明显膨大。蓇葖果深红色,每 5 个聚合如星状,长椭圆形,长 3.5~6 cm,宽 1.5~2 cm,顶端有长约 4 mm 的喙,基部钝形,外面密被淡黄褐色短柔毛和星状毛;每果有种子 3 个。种子黑色,椭圆形,长 10~12 mm,直径约 8 mm,外面光滑。

本新种与假苹婆 *S. lanceolata* Cav. 较相似,但叶倒卵形或椭圆状倒卵形,基部楔形,可以区别。

3 粗齿梭罗

Reevesia rotundifolia Chun in Sunyatsenia 1: 269. 1934.

Descr. fl. add: Flores albi fragrantis conferti in cymo-corymbum dispositi. Inflorescentiae 5~8 cm longae. Pedicelli 6 mm longi pubescentes; calyx infundibularis 1 cm longus, apice trilobus, lobis late triangulatis circ. 1.5 mm longis extus dense molliter fulvo-pubescentibus. Petala 5, spathulata apice rotundata basi in stipitem attenuatum. Androgynophora circ. 2.5 cm longa. Androecia capitata, circ. 2 mm diam. gynoecium cingentia. Ovaria ovoidea, circ. 1.5 mm longa, pubescentia. Styli breves inconspicui. Stigmata parva globulosa.

Guangxi (广西): Fangchang (防城), Nasuodongshan Mt. (那梭东山), alt. 380 m, in broad-leaved evergreen forest, 1994-05-04, Y. G. Xue (薛跃规) 9405005 (SYS).

花的补充记载:花白色,芳香,密生,排成聚伞状伞房花序;花序长 5~8 cm;花梗长 6 mm,被短柔毛。萼漏斗状,长 1 cm,顶端 3 浅裂,裂片阔三角形,长约 1.5 mm,外面密被淡黄褐色短茸毛;花瓣 5 片,匙形,长 3 mm,顶端圆形,基部渐狭成瓣柄;雌雄蕊柄长约 2.5 cm,雄蕊群聚合成头状,直径约 2 mm,包围着雌蕊;子房卵形,长约 1.5 mm,被毛,花柱短,




图2 桂苹婆 1. 果枝; 2. 种子。(余汉平 绘)

Fig. 2 *Sterculia guangxiensis* S. J. Xu et P. T. Li 1. Fruiting branch; 2. Seeds.

不明显; 柱头很小, 圆球形。(标本藏于中山大学标本室)

粗齿梭罗是中国珍稀濒危植物, 受到国家保护!

(责任编辑 徐 黎)